

Что делать, если **вызов ветеринара круглосуточно москва** собака подтекает мочой после стерилизации

Недержание мочи после стерилизации — распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы собак. Она требует внимательного отношения и грамотной диагностики.

Чаще всего речь идёт о гормональнозависимом недержании, которое развивается через несколько месяцев или лет после операции. Однако бывают и другие причины: инфекции мочевыводящих путей, камни в мочевом пузыре, ослабление мышц сфинктера. Важно понять, что именно происходит с вашим питомцем, и не заниматься самолечением. В этой статье мы разберём основные причины, симптомы и способы помочь собаке.

Причины недержания мочи у стерилизованных собак

Стерилизация — это удаление яичников и матки, что приводит к резкому снижению уровня эстрогена. У некоторых сук это вызывает ослабление мышц уретры и сфинктера мочевого пузыря. В результате моча может непроизвольно выделяться, особенно когда собака спит или расслаблена. Это называется недержанием, связанным с дефицитом эстрогена. Оно может проявиться в первые недели или спустя длительное время.

Однако не всегда причина кроется только в гормонах. Недержание может быть вызвано и другими проблемами: циститом, мочекаменной болезнью, аномалиями развития мочевыделительной системы, поражением нервов, которые могли возникнуть во время операции или по другим причинам. Нельзя исключать возрастные изменения и сопутствующие заболевания.

Как проявляется недержание мочи у собак

Главный признак — собака мочится без команды и контроля. Это может быть капли в состоянии покоя, лужица на подстилке после сна или сырость под собакой. Пёс может вылизывать область под хвостом из-за раздражения кожи мочой. Также может появиться запах мочи в доме.

Важно отличать недержание от обычного частого мочеиспускания. При недержании собака не контролирует процесс, тогда как при цистите или других болезнях она часто садится с усилием, возможно беспокоится. Если вы заметили изменение цвета мочи, жажду, вялость или температуру, это может указывать на инфекцию или другие серьёзные проблемы. В таких случаях нужно срочно обратиться к ветеринару.

Диагностика: какие обследования нужны

Для точной диагностики ветеринар назначит ряд процедур. Обычно оно <https://shounen.ru/ekonomika/4921-osnovnye-priznaki-trebujuschie-srochnogo-vmeshatelstva-veterinara.html> включает сбор анамнеза, клинический осмотр, анализ мочи, ультразвуковое исследование. Также могут потребоваться рентген, цитологию или биохимический анализ крови. Если есть неврологические симптомы проводится специальное неврологическое тестирование.

Диагноз «гормональнозависимое недержание» ставят, исключив другие болезни. Если анализы мочи без изменений, УЗИ не показывает камней или опухолей, а недержание продолжается, ветеринар может предположить недостаток эстрогена. В некоторых случаях проводится пробное лечение препаратами, замещающими гормоны. Назначать гормональные средства должен только врач.

Методы лечения недержания мочи

Терапия подбирается индивидуально. При гормональнозависимом недержании часто назначают препараты эстрогена в виде таблеток. Такое лечение улучшает тонус мышц и снижает симптомы. Дозу определяет только врач. Если причина в воспалении, назначаются противомикробные средства. При мочекаменной болезни может потребоваться хирургическое вмешательство или лечебное питание.

Есть и негормональные лекарства для контроля недержания. Например, симпатомиметики, которые повышают тонус сфинктера. Но у них есть побочные действия, поэтому нужен контроль специалиста. В некоторых случаях рекомендуется оперативное вмешательство — введение объёмобразующих веществ вокруг уретры. Это более сложный метод, но он может быть эффективен.

Уход и профилактика

Если у собаки недержание, важно обеспечить ей комфорт. Используйте впитывающие пелёнки или специальные подгузники для собак. Так вы сохраните чистоту и защитите кожу. Выводите собаку чаще — это снизит количество мочи в мочевом пузыре. Следите за гигиеной: подмывайте собаку тёплой водой и просушивайте шерсть.

Полностью предотвратить недержание нельзя, но риск можно уменьшить. Поговорите с врачом о подходящем возрасте для операции. Есть данные, что ранняя стерилизация может повышать риск недержания у некоторых пород. Но окончательное решение — за специалистом. Регулярные осмотры помогут вовремя заметить проблемы.

Заключение

Недержание мочи у собаки после стерилизации — не приговор. Сегодня есть методы, способные улучшить качество жизни собаки. Главное — не откладывать визит к врачу и не пытаться лечить животное самостоятельно.

Помните, что только ветеринар может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Следуйте советам врача и обеспечьте уход — это поможет питомцу.

Часто задаваемые вопросы

Обязательно ли собака будет подтекать мочой после стерилизации?

Не у всех. Недержание встречается лишь у некоторой доли прооперированных собак. Риск зависит от породы, возраста, веса и индивидуальных особенностей. Если вы заметили симптомы, обратитесь к ветеринару.

Можно ли вылечить недержание мочи у собаки полностью?

Во многих случаях удаётся значительно уменьшить симптомы или полностью их контролировать. Гормональная терапия и другие методы позволяют большинству собак жить нормальной жизнью. Однако полное излечение зависит от причины. Только ветеринар может дать прогноз.

Опасно ли гормональное лечение для собаки?

Если дозу подобрал врач, препараты переносятся нормально. Но могут быть побочные эффекты: повышение аппетита, жажда, изменения поведения. Поэтому лечение должно проходить под наблюдением ветеринара.

Недержание только во сне — это опасно?

Ночное подтекание часто указывает на гормональную природу. Но так же проявляются и иные заболевания. Нужно сдать мочу на анализ и сделать УЗИ. Обратитесь к ветеринару для диагностики.

Подходят ли собачьи подгузники при недержании?

Да, это удобное временное решение. Они сохраняют чистоту и защищают кожу. Но менять их надо часто и соблюдать гигиену. Они не лечат причину, а лишь облегчают уход.

Какие породы более склонны к недержанию после стерилизации?

Исследования указывают на повышенный риск у некоторых крупных пород, например, немецких овчарок, доберманов, боксёров. Но проблема может появиться у любой собаки. Важнее индивидуальный подход и наблюдение.