

Почему собака ездит попой по ковру

Когда собака елозит попой по полу или ковру, это не просто забавная привычка, а признак того, что питомец ощущает зуд, боль или раздражение в задней части тела. Такое поведение ветеринары часто называют признаком проблем с параанальными железами, кожей или пищеварительной системой. Не стоит наказывать питомца за это, а понять, что именно беспокоит животное.

Перемещаться на попе собака может и дома, и на улице — по мягкой и твёрдой поверхности. Хозяева нередко принимают это за игру или особенностью поведения, но такой симптом редко бывает беспричинным. Ниже мы разберём основные причины такого поведения, способы облегчения состояния дома и в клинике, а также признаки, при которых медлить нельзя.

Основные причины, почему собака ездит на попе

Если питомец елозит на попе, первое, что подозревают ветеринары, — проблемы с параанальными железами. Такие мешочки расположены по обе стороны от анального отверстия и выделяют секрет при дефекации. Когда содержимое становится густым или выводные протоки забиваются, железы переполняются, появляется давление на ткани и возникает выраженный зуд. Собака пытается избавиться от него, прижимаясь задней частью тела к полу.

Другие причины включают кожные аллергии и воспаления, глистные инвазии, болезни желудочно-кишечного тракта, травмы или инородные тела в области заднего прохода. В ряде случаев собака катается на попе из-за блох или клещей, которые вызывают зуд в области хвоста. У отдельных пород предрасположенность к запорам или мягкому стулу увеличивает вероятность закупорки мешочков. Кроме того такое действие бывает вызвано болью в пояснице, тазобедренных суставах, когда животное пытается найти облегчение.

1. Переполнение или воспаление параанальных желёз
2. Аллергии и кожные воспаления
3. Гельминты и другие паразиты
4. Проблемы с пищеварением, запор или понос
5. Повреждения, посторонние предметы или опухоли
6. Дискомфорт в области таза и спины

Как распознать проблему с параанальными железами

Если причина в параанальных железах, собака не только катается на попе, но и постоянно вылизывает область под хвостом, беспокоится при опорожнении кишечника или испытывает трудности с туалетом. От задней части тела может пахнуть неприятно, а возле заднего прохода возникает краснота или отёчность. Если процесс запущен формируется гнойник, способный прорваться и требующий немедленного вмешательства.

Не стоит самостоятельно сдавливать анальные мешочки, если вы не уверены в своих действиях — неумелые манипуляции способны повредить ткани и спровоцировать усиление воспаления.

Чтобы точно определить причину ветеринар проводит осмотр, пальпирует железы, проверяет кожу и может назначить дополнительные исследования. Иногда требуется цитология, соскоб кожи или УЗИ, чтобы убедиться в отсутствии инфекций и новообразований.

Другие возможные причины езды на попе

Если с параанальными железами всё в порядке, стоит проверить кожу и шерсть. Пищевые аллергии, укусы блох, воспаление от контакта с раздражителем могут провоцировать зуд у хвоста и побуждать питомца тереться задней частью тела о пол. Также глисты, особенно острицы, могут раздражать вокруг анального отверстия.

Не стоит сбрасывать со счетов проблемы желудочно-кишечного тракта. Запоры, понос, воспалительные процессы в кишке изменяют характер испражнений, что раздражает кожу. Когда питомец катается на попе после каждого опорожнения, это может указывать на боль в заднем проходе или прямой кишке. Тогда требуется консультация специалиста и возможно, диета или лечение.

Причина	Характерный признак	Действия
Застой анальных мешочков	Катается на попе, вылизывает зад, запах	Записаться на приём для опорожнения желёз
Аллергическая реакция или воспаление кожи	Краснота, зуд, расчёсывание	Исключить раздражитель, посетить врача
Гельминты	Зуд, неоформленный стул, похудение	Сдать анализы, провести дегельминтизацию
Патологии пищеварительной системы	Диарея, запор, боль при дефекации	Диета и лечение по назначению врача

Что делать дома до визита к ветеринару

Если собака ездит попой по ковру, не нужно впадать в панику, но и оставлять без внимания нельзя. Сначала проверьте зону под хвостом: имеются ли покраснения, ран, шишек или следов паразитов. Если видите гнойника или выраженного воспаления, не трогайте и срочно звоните в клинику.

Можно временно облегчить зуд, протирая кожу вокруг ануса тёплым раствором ромашки или физраствором. Не применяйте спиртосодержащие средства и не наносите гормональные препараты без назначения специалиста. Проверьте питание: резкое изменение рациона часто провоцирует проблемы с пищеварением. Если собака ест сухой корм, следите, чтобы вода всегда была в доступе.

- Осмотрите заднюю часть тела на предмет ран, шишек и покраснений
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать абсцессы или выдавливать железы
- Ведите наблюдение за стулом и поведением
- Запишитесь к врачу, если проблема держится дольше пары дней

Когда нужен срочный визит к ветеринару

Не каждый случай катания на попе требует экстренного вмешательства, но есть признаки, при которых откладывать визит опасно. Когда вы видите кровь в области анального отверстия, гнойные выделения, резкую болезненность при касании или подъём температуры, это повод срочно обратиться в ветклинику. Также вызывает опасение ситуация, когда питомец не ест, выглядит вялым или у неё рвота и понос.

При подозрении на абсцесс промедление опасно: инфекция может распространиться на близлежащие ткани и привести к заражению крови. Специалист может вскрыть и очистить очаг, назначить антибиотики и обработать рану. Если причина в болезни пищеварительного тракта, потребуется диета и медикаменты, подобранные для конкретного животного.

Профилактика проблем с задним проходом

Чтобы собака реже ездила на попе, следует заботиться о коже и работе кишечника. Периодически обрабатывайте питомца от блох и клещей, используйте средства от глистов по схеме, рекомендованной ветеринаром. Сбалансированный корм и достаточное количество воды помогают избежать запоров и разжижения стула.

Не забывайте про гигиену: после улицы проверяйте лапы и зону под хвостом, мойте с мягким шампунем при нужде. Когда у питомца густая длинная шерсть, подстригайте её вокруг анального отверстия, чтобы предотвратить загрязнение и зуд. При склонности к закупорке анальных мешочков ветеринар может показать, как правильно проводить уход за этой зоной.

Плановые осмотры позволяют выявить проблему на раннем этапе. Если питомец кажется здоровым, раз в год нужно проверять анальные мешочки у ветеринара. Особенно это актуально для собак с рыхлой кожей и складками в зоне хвоста.

Заключение

Езда на попе — это не просто особенность поведения, а сигнал о проблемах со здоровьем. Следите за своим любимцем, замечайте дополнительные симптомы и своевременно обращайтесь к врачу. Чем раньше установлена причина, тем легче и быстрее будет оказать помощь.

Часто задаваемые вопросы

Почему собака ездит попой по ковру?

Обычно причина кроется в зуде или неприятных ощущениях возле заднего прохода. Наиболее вероятные факторы: закупорка анальных мешочков, аллергические реакции, глисты, болезни пищеварительной системы. Точную причину определит врач после осмотра.

Опасно ли, если собака ездит на попе?

Само действие не является смертельно опасным, но указывает на проблему. Без лечения застой мешочков способен привести к гнойнику, а аллергия или паразиты — вызвать серьёзные [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) осложнения. Поэтому питомца нужно показать специалисту.

Можно ли самому выдавливать параанальные железы?

Не советуем делать это без подготовки. Неверное действие способно повредить слизистую и занести инфекцию. Эту манипуляцию должен проводить врач или обученный специалист. В некоторых случаях врач показывает владельцу технику.

Как отличить забитые железы от других причин?

При закупорке мешочков нередко возникает резкий запах, краснота и отёк возле заднего прохода. Питомец вылизывает эту зону и беспокоится при дефекации. Если причина иная зуд может распространяться по всему телу, меняется стул или обнаруживаются паразиты. Точный ответ даст осмотр.

Что делать, если у собаки абсцесс в области ануса?

Срочно обратиться в ветеринарную клинику. Не пытайтесь вскрывать абсцесс дома: это рискованно и способно вызвать заражение крови. Врач проведёт вскрытие и дренирование и назначит антибиотики.

После процедуры потребуются уход за раной по рекомендации [клиника неотложной ветеринарной помощи](#) ветеринара.

Как не допустить, чтобы собака каталась на попе?

Да, меры профилактики существуют. Регулярно обрабатывайте питомца от паразитов, следите за рационом и доступом к воде. Время от времени осматривайте состояние параанальных желёз у ветеринара. Если есть предрасположенность к закупорке врач может порекомендовать специальную диету или добавки.