

Понос у кошки: что можно сделать дома, а когда нужен ветеринар

Диарея у кошки — частая причина тревоги [вызов ветврача на дом круглосуточно](#) владельцев. По консистенции и сопутствующим признакам можно приблизительно понять, насколько всё серьёзно. В одних случаях достаточно покоя и обильного питья, в других счёт идёт на часы.

Эта статья поможет разобраться, что делать при жидком стуле у кошки, какие симптомы требуют срочного вызова ветеринара и чего делать не стоит до приезда доктора. Мы не заменяем очную консультацию, но поможем не растеряться.

Что считать жидким стулом

Жидкий стул — это водянистые или кашицеобразные испражнения, которые бывают многократно. Стоит оценить частоту, цвет, наличие крови или слизи, запах и поведение кошки. Разовая мягкая дефекация при хорошем аппетите — не то же самое, что многократный водянистый стул с вялостью.

Питомец любого пола и возраста может дать сбой после смены рациона, переезда, новую еду. Но жидкий стул — лишь признак, а не отдельное заболевание. Поэтому задачу решают не закреплением стула любой ценой, а выяснением причины.

Возможные причины

Причины условно делят на бытовые и требующие лечения. К безопасным относят перевод на новый корм, избыток еды, испуг или переезд, поедание несъедобного. Ко вторым — инфекционные заболевания, паразитов, токсическое воздействие, заболевания внутренних органов и инородное тело.

- Новый рацион без постепенного перехода
- Перекармливание или тяжёлая еда со стола
- Испуг: переезд, новый человек в доме
- Гельминты и одноклеточные
- Отравление: испорченная еда, бытовая химия
- Инфекции
- Проглоченный предмет в желудочно-кишечном тракте

Некоторые состояния не видны на глаз, например микоплазмоз у кошек. Это иногда сопровождается не только жидким стулом, но и слабостью, плохим аппетитом, выделениями из глаз или носа. Диагноз ставит только врач по результатам обследования и анализов.

На что смотреть в первую очередь

Проверьте состояние: десны и язык должны быть розовыми, а не бледными. Оцените кожу: если она не расправляется, вероятно обезвоживание. Считайте дыхательные движения в спокойном состоянии на фоне отдыха. Учащённое дыхание может быть признаком болевого синдрома, температуре или интоксикации.

Показатель О чём может говорить Насколько срочно Единичная мягкая дефекация Часто реакция на еду Наблюдение Частая водянистая дефекация Потеря жидкости Срочно Кровь, слизь в стуле Возможное

поражение кишечникаСрочноВялость, отказ от едыОбщее тяжёлое состояниеНужен врачПонос и рвотаВозможна инфекцияНужен врач

Если животное прячется, шипит или не даёт осмотреть, не настаивайте. Зафиксируйте, что получилось увидеть. Такая информация помогут врачу.

Что можно сделать до приезда врача

Уберите доступ к еде на несколько часов, если кошка не против, но доступ к воде оставьте. Не давайте человеческие препараты, обезболивающие или закрепляющие средства: часть из них токсичны для кошек.

1. Обеспечьте покой: уберите шум и других питомцев
2. Приготовьте лежанку впитывающей пелёнкой для контроля за испражнениями
3. Соберите сведения: что и когда ел, что произошло
4. Сохраните образец стула в чистый контейнер, если получится
5. Держите телефон под рукой

Когда у животного есть рвота с кровью, отнялись лапы, тяжёлое или шумное дыхание или потеря сознания — не ждите и звоните в ветеринарную помощь.

Когда нужно срочно звать ветеринара

Срочную помощь нужно вызывать, если помимо жидкого стула есть хотя бы один опасный признак: кровь в стуле, неукротимая рвота, вялость, отказ от воды, учащённое дыхание или боль в животе. У котят состояние ухудшается быстрее, поэтому ожидание опасно.

Отдельный повод для тревоги — нарушение опоры на задние лапы, дрожь или судороги. Такие симптомы могут быть связаны с травмой, неврологическим заболеванием или отравлением, и требуют безотлагательного осмотра.

Как подготовиться к вызову

Заранее подготовьте место для осмотра с нормальным освещением, соберите ветпаспорт, если он имеется, данные о прививках и последнем кормлении. Если кошка получает постоянные лекарства, покажите упаковки врачу.

- Документы на питомца
- Что и когда ел питомец
- Список препаратов
- Образец стула, если получилось собрать
- Контакты для связи

Беседа с врачом должен быть конкретным: расскажите когда началось, как часто, что менялось в питании, какие ещё симптомы есть. Чем подробнее информация, тем быстрее врач сориентируется.

Что происходит дальше

На месте врач осмотрит питомца, оценит степень обезвоживания, измерит температуру, проверит живот, сердечную и дыхательную системы. По результатам могут потребоваться анализы, УЗИ или капельница.

Решение о стационаре принимается индивидуально.

Если причина простая, лечение нередко сводится к диете и поддержке водного баланса. При инфекции возможны лекарственные средства, при паразитарных заболеваниях — средства от паразитов. Назначать их самостоятельно нельзя: неправильная доза или неподходящий препарат вредят. Эта статья носит справочный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Заключение

Понос у кошки — не всегда повод для паники, но всегда сигнал обратить внимание на состояние питомца. Оцените частоту дефекации, наличие крови и слизи, поведение и аппетит: это поможет понять, можно ли наблюдать дома или нужен врач.

Часто задаваемые вопросы

Когда жидкий стул у кошки считается опасным

Тревожным считают частый водянистый стул, кровь или слизь, сопровождающийся рвотой, выраженной слабостью, отказом от воды или учащённым дыханием. У котят состояние меняется быстро, поэтому лучше не откладывать обращение к ветеринару.

Дают ли кошке активированный уголь при поносе

Активированный уголь иногда применяют при подозрении на отравление, но дозировка и необходимость зависят от конкретного случая. Давать любые лекарства без назначения рискованно. Лучше описать симптомы врачу и действовать по его рекомендации.

Что дать кошке при отравлении в домашних условиях

До приезда врача уберите источник токсина, обеспечьте покой и доступ к воде. Не провоцируйте рвоту без указаний врача. Сохраните упаковку или остатки вещества, которое могло попасть к питомцу, и покажите врачу.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека

Микоплазмоз у кошек вызывается микроорганизмами не всегда опасны для человека, но риск и пути передачи оценивает врач. При подозрении на инфекцию нужны диагностика и лечение под наблюдением специалиста. Соблюдайте гигиену при контакте с животным.

Можно ли лечить понос у кошки диетой

Диета может быть частью терапии, но подбор корма зависит от причины и состояния кошки. Резкая смена рациона сама по себе иногда провоцирует понос. Поэтому важно менять корм постепенно и согласовать рацион с ветеринаром, особенно если понос длится больше суток.

Как быть, если жидкий стул у котёнка

У котят запас жидкости небольшой, поэтому обезвоживание развивается быстрее, чем у взрослых. При жидком стуле, отказе от еды или вялости лучше сразу обратиться к ветеринару. До приезда врача обеспечьте тепло, покой и доступ к воде.