

Микоплазмоз у кошек: признаки, обследование и что делать владельцу

Микоплазменная инфекция у кошек представляет собой бактериальное заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода *Mycoplasma*. У кошек чаще всего встречаются микоплазмы разных видов, которые могут поражать дыхательные пути, конъюнктиву и мочевыводящие пути. Важно понимать, что микоплазмы не всегда вызывают болезнь сами по себе: выраженные симптомы нередко связаны с ослаблением защитных сил или сопутствующего заболевания.

Если вы наблюдаете у кошки тревожные признаки — слабость, выделения из глаз или носа, отказ от еды — не пытайтесь лечить самостоятельно. Точный диагноз может только ветеринарный врач после обследования и лабораторных исследований. При тяжёлом состоянии — одышке, припадках, потере сознания — требуется экстренная помощь ветеринара. В этой статье обсудим, как распознать микоплазмоз, в чём его риск, какие обследования нужны и что делать владельцу.

Что такое микоплазмоз у кошек

Микоплазмы — это мельчайшие бактерии, у которых нет клеточной стенки. Из-за этой особенности ряд препаратов, работающие через оболочку микроба, не дают результата. Эти микроорганизмы встречаются повсеместно: их можно обнаружить у здоровых кошек и не вызывать болезни. Заболевание развивается, когда иммунитет ослабевает или возбудитель попадает в благоприятные условия.

Разные виды микоплазм поражают разные системы. Одни связаны с дыханием, другие — с глазами, третьи — с мочевыводящими путями. Название *Mycoplasma spp.* в анализах означает, что обнаружена группа микроорганизмов, а не один конкретный вид. Это важно учитывать при чтении заключения и подборе терапии.

Возбудитель нередко присутствует у внешне здоровых кошек. Обнаружение микоплазмы само по себе не равно диагнозу: значение имеют симптомы и состояние питомца.

Признаки и симптомы микоплазмоза

Клинические признаки микоплазменной инфекции определяются тем, какой орган вовлечён. Они могут быть размытыми и напоминать другие болезни. Хозяину стоит обращать внимание на общее самочувствие питомца и замечать перемены в поведении и питании.

- Выделения из глаз, воспаление конъюнктивы, прищуривание
- Насморк, чихание, затруднённое дыхание
- Вялость, отказ от еды, снижение активности
- Частое или болезненное мочеиспускание, кровь в моче
- Повышение температуры или её колебания
- Кашель, тяжёлое дыхание при поражении лёгких

Не стоит определять болезнь на глаз: большинство перечисленных симптомов встречаются при десятках других состояний. При тяжёлом дыхании, синюшности слизистых или обмороке, звоните сразу — счёт может идти на минуты.

Как ставят диагноз

Поставить диагноз микоплазмоз по симптомам невозможно. Специалист осматривает кошку, собирает анамнез, а затем назначает лабораторные тесты. Для анализа берут могут служить мазки со слизистых, кровь, моча или смывы из дыхательных путей.

Метод На что указывает ПЦР Выявляет генетический материал микоплазмы Микробиологический посев Определяет чувствительность к антибиотикам Общий и биохимический анализ крови Оценивает общее состояние и воспаление Исследование мочи Помогает при поражении мочевыводящих путей Осмотр офтальмологом Проверяет состояние слизистой глаз

Только лишь положительный результат ПЦР не подтверждает болезнь на сто процентов. Микроб способен жить как естественный обитатель, не вызывая вреда. Специалист связывает воедино данные исследований, клинические признаки и общее состояние животного, чтобы подобрать терапию.

Опасен ли микоплазмоз для человека и других животных

Кошачьи микоплазмы, обычно не передаются людям. Вероятность заражения человека оценивается как невысокая, и в группе повышенного внимания — пациенты с резко снижённым иммунитетом. Всё же важно мыть руки: мыть руки после контакта с животным, не давать питомцу облизывать лицо, следить за чистотой места питомца.

Среди домашних кошек заражение возможно. Кошка может заразиться от другой кошки при близком общении, общей посуде, подстилках. Если в доме несколько животных, больного стоит изолировать, выделить ему личные миски и следить за состоянием остальных.

Кто более уязвим

- Котята и молодые кошки
- Питомцы, перенёсшие стресс или переезда
- Животные с хроническими болезнями
- Питомцы, получающие подавляющие иммунитет препараты
- Кошки, живущие большими группами

Что делать владельцу: лечение и уход

Микоплазмоз лечат по назначению врача. Как правило, используются антибиотики, которые действуют на микоплазмы. Подбирать препарат самостоятельно недопустимо: неправильный выбор не поможет, а промедление опасно для питомца. Схему приёма и дозу назначает лишь специалист.

Дома питомцу нужен покой и удобные условия. Уберите стрессовые факторы, следите за питанием, обеспечьте доступ к воде. При отказе от еды дольше суток, можно смачивать слизистую и обращайтесь к врачу. Нельзя давать лекарства для людей и средства без назначения врача.

Примерная схема действий

1. Запишите симптомы и время их появления
2. Позвоните в круглосуточную ветслужбу
3. Выполняйте указания специалиста
4. При резком ухудшении немедленно вызывайте помощь
5. Точно следуйте прописанному лечению

При тяжёлом течении может потребоваться выезд ветеринара или госпитализация. Не откладывайте, если кошка не ест, тяжело дышит, обездвижен и не отвечает на раздражители. Ранняя помощь повышает шансы на скорейшее выздоровление.

Профилактика микоплазмоза

Полностью исключить заражение сложно, если возбудитель широко распространён. Однако снизить риск возможно: укрепляйте иммунитет питомца, следите за полноценным рационом, не пропускайте прививки, посещайте врача для профилактики. Периодические проверки позволяют выявить болезнь на ранней стадии.

Избегайте скученности, следите за чистотой в доме, мойте посуду и лотки. Если в доме недавно появился новый питомец, подержите его отдельно на время адаптации. Следите за самочувствием: слабость, выделения из глаз и носа, потеря аппетита — причина показать кошку специалисту.

Здоровый иммунитет — лучшая защита. Крепкое животное легче переносит контакт с возбудителем и быстрее восстанавливается.

Заключение

Микоплазменная инфекция требует серьёзного отношения, но и при единственном положительном результате **неотложная ветеринарная помощь 24/7** паниковать не нужно. Главное — оценивать состояние питомца в целом и действовать вместе с врачом. Вовремя проведённое обследование и корректно назначенная терапия дают хорошие шансы на выздоровление.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться микоплазмозом от кошки

Кошачьи виды микоплазм обычно не передаются людям. Риск повышается лишь при сильно ослабленном иммунитете. Мойте руки после контакта, мойте руки после общения с питомцем и поддерживайте чистоту.

Как подтверждают микоплазмоз у кошек

Только по симптомам диагноз поставить нельзя. Специалист применяет осмотр, лабораторные тесты, ПЦР, бактериальные посевы и анализы крови и мочи. Итоги трактуют вместе с симптомами и состоянием животного.

Что делать при положительном анализе без симптомов

Один положительный результат не всегда означает болезнь. Микроб нередко существует как условно-патогенный. Решение принимает врач после всестороннего осмотра и оценки состояния питомца.

Кто в группе риска

Чаще страдают котята, молодые кошки, ослабленные кошки и животные после стресса. Хронические болезни и снижение иммунитета повышают риск появления симптомов.

Помогут ли домашние средства при микоплазмозе

Народные средства не заменяют лечение. Возбудитель нечувствителен ко многим лекарствам, поэтому подбор антибиотика должен делать врач. Самолечение рискует навредить и затянуть восстановление.

Когда при подозрении на микоплазмоз нужно вызывать врача срочно

Срочно обращайтесь, если у питомца одышка, синюшность слизистых, припадки, обморок, не прекращается кровотечение или питомец не может встать. В таких случаях время критично.